

除草剤

名称:アピロトップMX 1キロ粒剤51
種類:ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル・メソトリオン粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリフタリドを含む農業の総使用回数	プレチラクロールを含む農業の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農業の総使用回数	メソトリオンを含む農業の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(北海道、東北を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用					
直播水稻	水田一年生雑草 及び ホタルイ ミズガヤツリ セリ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで	壤土～埴土			湛水散布	北陸・関東・東山・東海、近畿・中国・四国				