

除草剤

名称: アピロファインDジャンボ  
種類: ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ (北海道を除く)	移植後5日～ノ ビエ3葉期 た だし、移植後 30日まで	砂壤土～埴土	小包装(パッ ク)10個 (300g)/10a	1回	水田に小包装 (パック)のま ま投げ入れ る。	全域(関東・東 山・東海、近 畿・中国・四 国を除く)の普 通期及び早期 栽培地帯
	ヘラオモダカ (北海道、東 北) オモダカ(近 畿・中国・四 国を除く) シズイ(東北) クログワイ(北 海道を除く) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻 類による表層 はく離	移植後1日～ノ ビエ3葉期 た だし、移植後 30日まで					関東・東山・東 海、近畿・中 国・四国の普 通期及び早期 栽培地帯

ジメタメトリンを含む農薬の総 使用回数	ピラゾスルフロンエチルを含む 農薬の総使用回数	ピリフタリドを含む農薬の総使 用回数	プレチラクロールを含む農薬 の総使用回数
2回以内	1回	2回以内	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号

シンジェンタ ジャパン株式会社  
www.syngenta.co.jp