

除草剤

名称: アピロキリオMX1キログラム剤75
種類: ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル・メソトリオン粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | ピリフタリドを含む農薬の総使用回数 | プレチラクロールを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 | メソトリオンを含む農薬の総使用回数 |
|------|--|--------------------------------------|-------|---------|---------|----------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ クログワイ(北海道を除く) オモダカ ヒルムシロ セリ シズイ(北海道を除く) アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後～ ノビエ3葉期 ただし、移植後 30日まで | 壤土～埴土 | 1kg/10a | 1回 | 湛水散布 | 北海道、東北 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| | | 移植後5日～ ノビエ3葉期 ただし、移植後 30日まで | 砂壤土 | | | | | | | | |
| | | 移植時 | 壤土～埴土 | | | 田植同時散布 機で施用 | | | | | |

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号