

## 除草剤

名称:アピロプロフロアブル  
種類:ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤

### 適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(東北) ヘラオモダカ オモダカ クログワイ(東北) シズイ(東北) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ノ ビエ3葉期(但 し、砂壤土は 移植後5日～ノ ビエ3葉期)た だし、移植後 30日まで	砂壤土～埴土	500mL/10a	1回	原液湛水散布 又は水口施用	北海道、東北
		移植時	壤土～埴土			田植同時散布 機で施用	

ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号