

除草剤

名称:アピロスター1キロ粒剤
種類:ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、東北) オモダカ(北陸、近畿・中国・四 国を除く) クログワイ(北海道、北陸を除 く) シズイ(東北) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による表層はく 離	移植直後～ノビ エ3葉期 ただ し、移植後30日 まで(砂壤土 は移植後5日～ ノビエ3葉期 た だし、移植後30 日まで)	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(関東・東 山・東海を除く) の普通期及び早 期栽培地帯
		移植直後～ノビ エ3葉期 ただ し、移植後30日 まで					関東・東山・東 海の普通期及び 早期栽培地帯
	移植時	壤土～埴土	田植同時散布 機で施用			全域(関東・東 山・東海を除く) の普通期 及び早期栽培地 帯	
		砂壤土～埴土				関東・東山・東 海の普通期及び 早期栽培地帯	
直播水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	稲1.5葉期～ノビ エ3葉期 ただ し、収穫75日前 まで	壤土～埴土			湛水散布	北陸、関東・東 山・東海、近畿・ 中国・四国

ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数	ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の 総使用回数
1回	2回以内	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号