

除草剤

名称: アピロトップA1キロ粒剤36
種類: アジムスルフロン・ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル粒剤

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(東北) ヘラオモダカ オモダカ クログワイ(東北) シズイ(東北) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ノビ エ3葉期 ただ し、移植後30日 まで(但し、砂壌 土は移植後5日 ～ノビエ3葉期 ただし、移植後 30日まで)	砂壌土～埴土	1kg/10a	1回	湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散布	北海道、東北
		移植時	壤土～埴土			田植同時散布 機で施用	

アジムスルフロンを含む農薬の総使用回数	ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
1回	2回以内	2回以内	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号