

## 除草剤

名称: アピロトップLフロアブル  
種類: ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤

### 適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植直後～ノ ビエ2.5葉期 (但し、砂壤土 は移植後3日 ～ノビエ2.5葉 期)ただし、移 植後30日まで	砂壤土～埴土	350mL/10a	1回	原液湛水散布 又は水口施用	全域(北海道、 東北を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯
		移植時	壤土～埴土			田植同時散布 機で施用	

ピリフタリドを含む農薬の総使用回数	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号