

## 除草剤

名称:ソルネット1キロ粒剤  
種類:プレチラクロール粒剤

### 適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プレチラクロールを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	植代後～移植前4日又は移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	壤土～埴土 但し、北海道、東北、北陸では砂壤土を含む	1kg/10a	1回	湛水散布	全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	2回以内
	近畿・中国・四国及び九州の普通期及び早期栽培地帯							
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	移植時				田植同時散布機で施用	全域(近畿・中国・四国、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯	
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ						近畿・中国・四国及び九州の普通期及び早期栽培地帯	

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号