

殺虫剤

名称: アファーム乳剤  
種類: エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
みかん	アザミウマ類 ミカンハモグリガ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
未成熟とうもろこし	オオタバコガ			収穫30日前まで			
とうもろこし(子実)	ヨトウムシ			収穫7日前まで	3回以内		
かんしょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ			収穫前日まで			
さやいんげん	マメハモグリバエ			収穫3日前まで			
さやえんどう	ハスモンヨトウ	1000～2000倍	100～300L/10a	3回以内	3回以内		3回以内
豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	ハモグリバエ類						
すいか	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
きゅうり	ウリノメイガ						
	ハスモンヨトウ トマトハモグリバエ						
ズッキーニ にがうり	オオタバコガ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内	
うり類(漬物用)	ハスモンヨトウ						
	ハダニ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類						
	メロン	ミナミキイロアザミウマ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内
ミカンキイロアザミウマ ウリノメイガ ハモグリバエ類							
トマト	マメハモグリバエ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	5回以内	
ミニトマト	オオタバコガ トマトサビダニ						
なす	アザミウマ類 マメハモグリバエ						
	チャノホコリダニ						
	ハダニ類						
	オオタバコガ ハスモンヨトウ						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数								
ピーマン	オオタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内								
とうがらし類				収穫7日前まで											
キャベツ	コナガ	1000～2000倍		100～300L/10a	収穫前日まで		3回以内	散布	3回以内						
	アオムシ														
	ヨトウムシ														
	タマナギンウワバ														
	ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ														
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	1000～2000倍		100～300L/10a	収穫3日前まで		3回以内	散布	3回以内						
非結球レタス															
はくさい	コナガ	1000～2000倍		100～300L/10a	収穫7日前まで		3回以内	散布	3回以内						
だいこん	アオムシ														
	コナガ														
カリフラワー	コナガ									1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アオムシ														
	アザミウマ類 オオタバコガ														
ブロッコリー	コナガ	1000～2000倍		100～300L/10a	収穫3日前まで		3回以内	散布	3回以内						
	アオムシ														
	ヨトウムシ オオタバコガ														
なばな類	コナガ	1000～2000倍		100～300L/10a	収穫7日前まで		2回以内	散布	2回以内						
	アオムシ														
	ヨトウムシ														
	ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ														
のざわな	アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内								
チンゲンサイ	コナガ														
	アオムシ														
パセリ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回								
こまつな	コナガ			収穫3日前まで	2回以内		2回以内								
非結球あぶらな科葉菜類 (のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く)	アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内								
	コナガ														
	ヨトウムシ														
	ハスモンヨトウ														
	ハモグリバエ類														
	アザミウマ類 ハイマダラノメイガ														
セルリー	マメハモグリバエ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内								
	オオタバコガ														
	タバコガ														
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ														

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用流量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数																														
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内																														
	ネギハモグリバエ	1000倍																																			
わけぎ	シロイチモジヨトウ	1000～2000倍		収穫7日前まで	2回以内		散布	2回以内																													
あさつき	シロイチモジヨトウ	1000～2000倍																																			
しゅんぎく	マメハモグリバエ	2000倍		収穫前日まで					2回以内	散布	2回以内																										
	アザミウマ類																																				
	シロイチモジヨトウ																																				
エンダイブ	オオタバコガ			2000倍								収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内																						
	ハスモンヨトウ																																				
すいぜんじな	タマナギンウワバ											2000倍				収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内																		
	ハモグリバエ類																																				
	アザミウマ類																																				
	ヨトウムシ																																				
	ハスモンヨトウ																																				
みつば	オオタバコガ															2000倍				収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	2回以内	散布	2回以内														
	ハダニ類																																				
	キアゲハ																																				
	ヨトウムシ																																				
しそ	ハスモンヨトウ																			2000倍				収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内										
	カンザワハダニ																																				
いちご	オオタバコガ		2000倍			収穫前日まで																		2回以内				散布	2回以内								
	ヨトウムシ																																				
	ハスモンヨトウ																																				
オクラ	オオタバコガ				2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布																						2回以内							
	ハダニ類																																				
アスパラガス	オオタバコガ	2000倍				収穫前日まで			2回以内	散布	2回以内																										
	ハスモンヨトウ																																				
ほうれんそう	ヨトウムシ			2000倍		収穫3日前まで							2回以内	散布	2回以内																						
	ハスモンヨトウ																																				
	ホウレンソウケナガコナダニ																																				
かぶ	コナガ					2000倍						収穫前日まで					2回以内	散布	2回以内																		
トレビス	オオタバコガ																																				
非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ																														1000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
にんじん	マメハモグリバエ											2000倍																			収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内			
みょうが(花穂)	ハダニ類																																				
みょうが(茎葉)	ハダニ類															2000倍					みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで	2回以内	2回以内														
エンサイ	ハスモンヨトウ															2000倍					収穫7日前まで	2回以内	散布								2回以内						
メキャベツ	ハスモンヨトウ																				1000倍														収穫3日前まで	3回以内	3回以内
葉しょうが	ハスモンヨトウ																			2000倍	収穫7日前まで				2回以内	散布	2回以内										
かぼちゃ	アザミウマ類																																				
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ		2000倍																		収穫前日まで			2回以内				散布	2回以内								
モロヘイヤ	ハスモンヨトウ																				1000倍														収穫14日前まで	1回	1回
	ハスモンヨトウ																				2000倍														収穫前日まで	2回以内	散布
	ハスモンヨトウ				1000倍		収穫前日まで	3回以内																						3回以内							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン安息香酸塩を含む農薬の総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
	ヨモギエダシャク						
	チャノキイロアザミウマ						
	チャノホソガ						
	チャハマキ	2000倍					
	チャノホコリダニ						
ハスモンヨトウ							
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
ストック	コナガ						
マーガレット	ハスモンヨトウ						
花き類・観葉植物	オオタバコガ	1000倍					
	ハモグリバエ類						
	ヨトウムシ類	2000倍					
	ミカンキイロアザミウマ						

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

## シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号