

殺虫剤

名称: チェス顆粒水和剤
種類: ピメトロジン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメトロジンを含む農薬の総使用回数			
もも	アブラムシ類	5000倍	200 ~ 700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内			
うめ				収穫21日前まで						
なし		1000倍	100 ~ 300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内			
ばれいしょ										
メロン	アブラムシ類	5000倍	25L/10a	収穫3日前まで	4回以内		4回以内			
すいか										
きゅうり	コナジラミ類	5000倍	100 ~ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内		4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)			
ズッキーニ	アブラムシ類							2回以内	3回以内	3回以内(定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
トマト	コナジラミ類									
ミニトマト	アブラムシ類							3回以内	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)	
ピーマン	コナジラミ類									
とうがらし類	アブラムシ類					4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)				
なす	コナジラミ類									
いちご	アブラムシ類					3回以内		3回以内		
	コナジラミ類									
花き類・観葉植物	アブラムシ類					4回以内		発生初期	4回以内	
	コナジラミ類									

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号