

殺虫剤

名称:サイハロン水和剤
種類:シハロトリン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ハマキムシ類					
	ギンモンハモグリガ					
	モモチョッキリゾウムシ					
	キンモンホソガ	2000～3000倍				
	アブラムシ類					
なし	シンクイムシ類	2000倍				
	ハマキムシ類					
	ナシチビガ					
	カメムシ類					
	アブラムシ類	2000～3000倍				
もも	シンクイムシ類	2000倍				
	モモハモグリガ					
	アブラムシ類	2000～3000倍				
かき	カキノヘタムシガ	2000～3000倍				
	チャノキイロアザミウマ	2000倍				
	カキクダアザミウマ					
	イラガ類					
	カメムシ類					
	ぶどう		チャノキイロアザミウマ	2000倍	1回	1回
みかん	ミカンハモグリガ	2000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内	
	チャノキイロアザミウマ					
	アブラムシ類					
	カメムシ類					
キャベツ	アオムシ	2000～3000倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
	コナガ					
	アブラムシ類					
	ヨトウムシ					
	タマナギンウワバ					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数
はくさい	アオムシ	2000～3000倍	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	コナガ					
	アブラムシ類					
	ヨトウムシ					
	タマナギンウワバ					
だいこん	アオムシ		収穫21日前まで			
	コナガ					
	アブラムシ類					
	ヨトウムシ					
レタス	アブラムシ類		収穫14日前まで			
非結球レタス		収穫21日前まで				
		きゅうり	オンシツコナジラミ			
なす	アブラムシ類			2000倍	収穫前日まで	
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	4回以内				
	アブラムシ類					
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍	収穫7日前まで	1回		
茶	チャノコカクモンハマキ	2000倍	摘採7日前まで			
	チャノホソガ					
	チャノキイロアザミウマ					
	コミカンアブラムシ					
	チャノミドリヒメヨコバイ					
	ヨモギエダシャク					
	チャハマキ					
たばこ	タバコガ	2000～3000倍	収穫10日前まで	2回以内		
	ヨトウムシ					
芝	シバツトガ	発生初期	3回以内	1㎡当り300mL 散布		
	スジキリヨトウ					

・ 使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号