

殺虫剤

名称: ジュリボフロアブル
種類: クロラントラニプロロール・チアメトキサム水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロロールを含む農薬の総使用回数	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り 0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	4回以内(粒剤の処理、水溶剤及び水和剤の灌注は合計1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計3回以内)
	ネギアザミウマ							
	コナガ							
	アオムシ							
	ヨトウムシ							
	ハスモンヨトウ							
	ハイマダラノメイガ							
はくさい	アブラムシ類							
	コナガ							
	ハイマダラノメイガ							
	ヨトウムシ							
レタス	アブラムシ類							
	カブラヤガ							
	ヨトウムシ							
	ハスモンヨトウ							
	オオタバコガ							
	ナモグリバエ							
	ヒメフタテンヨコバイ							
ブロッコリー	アブラムシ類							
	ネギアザミウマ							
	コナガ							
	アオムシ							
	ハスモンヨトウ							
	ハイマダラノメイガ							
非結球レタス	アブラムシ類							
	カブラヤガ							
	ヨトウムシ							
	ハスモンヨトウ							
	オオタバコガ							
	ナモグリバエ							
	ヒメフタテンヨコバイ							
							4回以内(粒剤の処理及び水和剤の灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	
							4回以内(粒剤の処理及び水和剤の灌注は合計1回以内、散布は3回以内)	
							1回	

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号