

殺虫剤

名称:エンセダン乳剤
種類:プロフェノホス乳剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフェノホスを含む農薬の総使用回数					
ばれいしょ	ヨトウムシ	1500倍	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内					
	テントウムシダマシ										
	アブラムシ類										
かんしょ	ナカジロシタバ	1500倍	収穫7日前まで	3回以内		散布	3回以内				
	ハスモンヨトウ										
てんさい	ヨトウムシ	1500倍	収穫7日前まで	3回以内			散布	3回以内			
	カメノコハムシ										
	ナミハダニ										
茶	チャノココクモンハマキ	1000~1500倍	最終摘採後~ 萌芽前まで 但し、摘採60日 前まで	1回				散布	1回		
	チャハマキ										
	チャノキイロアザミウマ										
	チャノホソガ	1000倍			最終摘採後~ 萌芽前まで 但し、摘採60日 前まで					1回	散布
	チャノミドリヒメヨコバイ										
	カンザワハダニ										
	ヨモギエダシヤク										
チャノホコリダニ											
つばき類	チャドクガ	1500倍	-	4回以内		散布	4回以内				
ガーベラ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	-	6回以内			6回以内				

・ 使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号