

殺虫剤

 名称:フォース粒剤
 種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	コガネムシ類	9kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和 又は作条土壌混和	1回
	ハリガネムシ類					
らっかせい	コガネムシ類	4kg/10a	は種時		全面土壌混和	
ほうれんそう	ネキリムシ類					
キャベツ						
はくさい	ネキリムシ	9kg/10a	定植時		全面土壌混和	
レタス	ネキリムシ類					
非結球レタス	ネキリムシ類	6~9kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
はつかだいこん	キスジノミハムシ					
だいこん	タネバエ	4kg/10a	は種時		全面土壌混和	
かぶ	キスジノミハムシ					
	ネキリムシ類					
非結球あぶらな科葉菜類	キスジノミハムシ	6kg/10a	植付時		全面土壌混和	
なばな類	コガネムシ類					
いちご(仮植床)	コガネムシ類	4~12kg/10a	は種時		作条土壌混和	
にんじん	ネキリムシ類					
にんじん(葉)		4kg/10a	全面土壌混和			
ねぎ		4~9kg/10a	定植時		作条土壌混和	
ブロッコリー						
パセリ		4kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
			定植時		植溝土壌混和 又は全面土壌混和	
やまのいも		タネバエ	植付時		植溝土壌混和	
やまのいも(むかご)						
さとうきび		ハリガネムシ類	6kg/10a			
うめ		アカマダラケシキスイ	10kg/10a	収穫3日前まで	全面土壌混和	
茶	ナガチャコガネ	9kg/10a	成虫飛来初期 但し、摘採7日前まで	雨落ち部土壌混和		
つつじ類	コガネムシ類		植付時	全面土壌混和		