

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数	
りんご	ハマキムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	キンモンホソガ	2000～3000倍						
かんしょ	ハスモンヨトウ		2000～3000倍	2回以内	2回以内			
	ナカジロシタバ							
キャベツ	コナガ		3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		3回以内	3回以内
	アオムシ							
	ヨトウムシ							
	ハスモンヨトウ							
	ハイマダラノメイガ							
はくさい	コナガ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
	アオムシ							
レタス	オオタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
だいこん	コナガ	3000倍		収穫7日前まで				
	アオムシ		2000倍	収穫21日前まで				
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍		100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
ねぎ	シロイチモジ							
わけぎ	ヨトウ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内		
なす	オオタバコガ							
トマト	オオタバコガ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内		
	ハスモンヨトウ	3000倍						
	ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍						
	トマトサビダニ	2000倍						
	コナジラミ類							
	ハモグリバエ類	1000倍						

殺虫剤

 名称: マッチ乳剤
 種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
ミニトマト	オオタバコガ	2000~3000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	3000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
	トマトサビダニ						
	コナジラミ類						
ピーマン	オオタバコガ	1000~2000倍	25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
きゅうり	ウリノメイガ						3000倍
	コナジラミ類	100~300L/10a					
いちご	ミカンキイロアザミウマ	3000倍	25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	4回以内
	ハスモンヨトウ						
てんさい	ヨトウムシ	750倍	100~150L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	カメノコハムシ	3000倍					
	アシグロハモグリバエ						
	シロオビノメイガ						
だいず	ハスモンヨトウ	3000倍	80~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
えだまめ	100~300L/10a						

殺虫剤

名称: マッチ乳剤
種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
みかん	チャノキイロアザミウマ	2000~3000倍	200~700L/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	ミカンハモグリガ						
	ミカンサビダニ						
	アゲハ類						
	ヨモギエダシヤク						
かんきつ(みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ	2000~3000倍	200~700L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
	ミカンハモグリガ						
	ミカンサビダニ						
	アゲハ類						
	ヨモギエダシヤク						
茶	チャハマキ	200~400L/10a	200~400L/10a	摘採7日前まで			
	チャノコカクモンハマキ						
	ヨモギエダシヤク						
	チャノキイロアザミウマ						
	チャノホソガ						
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	100~300L/10a	発生初期	5回以内		5回以内
	マメハモグリバエ						
花き類・観葉植物(きくを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍					