

殺虫剤

名称:プレバソンフロアブル5
種類:クロラントラニプロール水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	コナガ	500倍	苗地床1㎡当り 2L	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、散布は3回 以内)			
	アオムシ									
	コナガ	100倍	セル成型育苗 トレイ1箱また はペーパー ポット1冊(約30 ×60cm、使用 土壌約1.5～ 4L)当り0.5L							
	アオムシ									
	ヨトウムシ									
	ハスモンヨトウ									
	ハイマダラノメ イガ									
	コナガ									
	アオムシ	2000倍	100～ 300L/10a					収穫前日まで	3回以内	散布
	ヨトウムシ									
	ハスモンヨトウ									
	ハイマダラノメ イガ									
	ウワバ類									
	オオタバコガ									
コナガ	100倍			セル成型育苗 トレイ1箱また はペーパー ポット1冊(約30 ×60cm、使用 土壌約1.5～ 4L)当り0.5L	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注			
アオムシ										
ヨトウムシ										
ハイマダラノメ イガ										
コナガ										
アオムシ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布					
ヨトウムシ										
ハイマダラノメ イガ										
ハスモンヨトウ										
ハスモンヨトウ										

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニ リブロールを含む農薬の総使用回数
レタス	ナモグリバエ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	カブラヤガ						
	ヨトウムシ						
	ヒメフタテンヨコバイ						
レタス	ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ヨトウムシ						
非結球レタス	ナモグリバエ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ヨトウムシ						
	ナモグリバエ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
	ハスモンヨトウ						
	オオタバコガ						
	ヨトウムシ						
ブロッコリー	コナガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	アオムシ						
	ハスモンヨトウ						
	コナガ						
	アオムシ						
	ハスモンヨトウ						
	ハイマダラノメイガ						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントリ リプロールを含 む農薬の総使 用回数
トマト	トマトハモグリ バエ	100倍	1株当り25mL	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以 内、散布は3回 以内)
		1000～2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	オオタバコガ	2000倍					
ミニトマト	トマトハモグリ バエ	100倍	1株当り25mL	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	
		2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	オオタバコガ						
きゅうり	トマトハモグリ バエ	100～200倍	1株当り25mL	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	
		1000～2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	ウリノメイガ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントリ リプロールを含 む農薬の総使 用回数
なす	カブラヤガ	100倍	1株当たり25mL	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以 内、散布は2回 以内)
	ハスモンヨトウ						
	トマトハモグリ バエ	1000～2000倍	2回以内				
	オオタバコガ						
いちご	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	散布	2回以内	
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ					3回以内	
みずな	コナガ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
こまつな							
チンゲンサイ							
ねぎ	シロイチモジヨ トウ	4000倍		収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ						
きく	オオタバコガ	2000倍		発生初期	4回以内	散布	4回以内
	ハスモンヨトウ						
たばこ	ヨトウムシ		100～ 180L/10a	収穫10日前ま で			
だいず	ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプ ターによる散 布	2回以内
		16～32倍	0.8L/10a				

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号