

### 殺虫剤

名称: スプラサイド水和剤  
種類: DMTP水和剤

#### 適用の範囲と使用方法

| 作物名          | 適用病害虫名              | 希釈倍数       | 使用液量          | 使用時期          | 本剤の使用回数 | 使用方法                                    | DMTPを含む農薬の総使用回数        |      |      |
|--------------|---------------------|------------|---------------|---------------|---------|---|------------------------|------|------|
| かんきつ(みかんを除く) | ヤノネカイガラムシ(幼虫～未成熟成虫) | 1500倍      | 200～700 L/10a | 収穫90日前まで      | 4回以内    | 散布                                      | 4回以内                   |      |      |
|              | カメムシ類               |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| みかん          | ヤノネカイガラムシ(幼虫～未成熟成虫) | 1500倍      |               | 収穫14日前まで      |         |   | 4回以内(50～100倍希釈散布は2回以内) |      |      |
|              | カメムシ類               |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| りんご          | モモシクイガ              | 1500～2000倍 |               | 200～700 L/10a |         |   | 収穫30日前まで               | 2回以内 | 2回以内 |
|              | ナシヒメシクイ             |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | クワコナカイガラムシ          |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | アブラムシ類              | 1500倍      |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | ハマキムシ類(コカクモンハマキを除く) |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | ギンモンハモグリガ           |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | カメムシ類               |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| リンゴワタムシ      |                     |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| なし(有袋栽培)     | シンクイムシ類             | 1500～2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫7日前まで       | 3回以内    | 3回以内                                    |                        |      |      |
|              | アブラムシ類              |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | クワコナカイガラムシ          |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | ナシホソガ               | 1500倍      |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | カメムシ類               |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| ナシチビガ        |                     |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| なし(無袋栽培)     | シンクイムシ類             | 1500～2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫45日前まで      | 2回以内    | 2回以内                                    |                        |      |      |
|              | アブラムシ類              |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | クワコナカイガラムシ          |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | ナシホソガ               | 1500倍      |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | カメムシ類               |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| ナシチビガ        |                     |            |               |               |         |   |                        |      |      |
| もも           | モモシクイムシ             | 1500～2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫21日前まで      | 2回以内    | 4回以内(200倍希釈散布は2回以内、1500～2000倍希釈散布は2回以内) |                        |      |      |
|              | クワシロカイガラムシ          |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | ナシヒメシクイ             |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | モモノゴマダラノメイガ         |            |               |               |         |   |                        |      |      |
|              | モモハモグリガ             |            |               |               |         |   |                        |      |      |

| 作物名         | 適用病害虫名       | 希釈倍数  | 使用液量                | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DMTPを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|--------------|-------|---------------------|----------|---------|------|-----------------|
| ぶどう         | クワコナカイガラムシ   | 1500倍 | 200~700 L/10a       | 収穫14日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内(休眠期は1回以内)  |
|             | ブドウネアブラムシ    | 500倍  | 10 L/m <sup>2</sup> | 収穫90日前まで |         | 土壌灌注 |                 |
| かき          | ツノロウムシ幼虫     | 1500倍 | 200~700 L/10a       | 収穫30日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内            |
|             | フジコナカイガラムシ幼虫 |       |                     |          |         |      |                 |
|             | カキクダアザミウマ    |       |                     |          |         |      |                 |
|             | カキノヒメヨコバイ    |       |                     |          |         |      |                 |
|             | カメムシ類        |       |                     |          |         |      |                 |
| チャノキイロアザミウマ | 1000倍        |       |                     |          |         |      |                 |
| おうとう        | ウメシロカイガラムシ   | 1500倍 | 200~700 L/10a       | 収穫7日前まで  | 2回以内    | 散布   | 2回以内            |
|             | カメムシ類        |       |                     |          |         |      |                 |
|             | ショウジョウバエ類    |       |                     |          |         |      |                 |
| キウイフルーツ     | クワシロカイガラムシ   | 1500倍 | 200~700 L/10a       | 収穫60日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内            |
| うめ          | ウメシロカイガラムシ   | 1500倍 | 200~700 L/10a       | 収穫14日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内            |
| すいか         | ミナミキイロアザミウマ  | 1000倍 | 100~300 L/10a       | 収穫3日前まで  | 5回以内    | 散布   | 5回以内            |
| メロン         |              |       |                     | 収穫3日前まで  | 2回以内    |      | 2回以内            |
| なす          | オンシツコナジラミ    | 1000倍 | 100~300 L/10a       | 収穫14日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内            |
|             | ミナミキイロアザミウマ  |       |                     |          |         |      |                 |
| ピーマン        | オンシツコナジラミ    | 1000倍 | 100~300 L/10a       | 収穫14日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内            |
| 花き類・観葉植物    | オンシツコナジラミ    | 1000倍 | 100~300 L/10a       | 発生初期     | 6回以内    | 散布   | 6回以内            |

| 作物名 | 適用場所                    | 適用病害虫名     | 使用量      | 使用液量   | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DMTPを含む農薬の総使用回数 |
|-----|-------------------------|------------|----------|--------|----------|---------|------|-----------------|
| ぶどう | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | クワコナカイガラムシ | 200g/10a | 9L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内    | 常温煙霧 | 2回以内(休眠期は1回以内)  |

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号