

## 殺虫剤

名称:トリガード液剤  
種類:シロマジン液剤

### 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シロマジンを含む農薬の総使用回数
メロン	トマトハモグリバエ	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
トマト	ハモグリバエ類				2回以内		2回以内
ミニトマト					3回以内		3回以内
なす	マメハモグリバエ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
セルリー					3回以内		3回以内
しゅんぎく	ハモグリバエ類			収穫前日まで	3回以内		3回以内
チンゲンサイ					2回以内		2回以内
とうがん					3回以内		3回以内
かぼちゃ					2回以内		2回以内
食用ぎく					4回以内		4回以内
花き類・観葉植物	マメハモグリバエ			発生初期	4回以内		4回以内
きく(葉)	ハモグリバエ類			収穫7日前まで	1回		1回

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ (<http://www.syngenta.co.jp>) を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号