

## 殺虫殺菌剤

名称:シンジェンタ ビルダーフェルテラチェス粒剤  
種類:クロラントラニプロール・ピメロジン・プロベナゾール粒剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ピメロジンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病	育苗箱 (30×60×3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り50g	緑化期～移植 当日	1回	育苗箱の上か ら均一に散布 する。	1回	3回以内(育苗 箱散布は1回 以内、本田で は2回以内)	2回以内(育苗 箱への処理及 び側条施用は 合計1回以内)
	ウンカ類							
	コブノメイガ							
	ツマグロヨコバ イ							
	白菜枯病		移植3日前～ 移植当日					
	もみ枯細菌病							
	イネドロオイム シ							
	イネミズゾウム シ							
	フタオビコヤガ							

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号