

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	株腐病		8mL/乾燥種子1kg			塗沫処理	
	うどんこ病	2000~3000倍	100~200L/10a	3回以内	散布		
	赤さび病						
だいず	紫斑病	16~24倍	800mL/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	2回以内
	腐敗粒べと病	2000倍					
きゅうり	うどんこ病	1500~2000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
	べと病						
	灰色かび病	1500倍					
	菌核病						
褐斑病	2000倍						
炭疽病							
にがうり	うどんこ病	2000倍			3回以内		3回以内
	べと病						
	炭疽病						
うり類(漬物用)	うどんこ病	1500~2000倍		収穫7日前まで			
	つる枯病						
	べと病						
メロン	うどんこ病		100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内		4回以内
	つる枯病						
	べと病						
すいか	つる枯病			収穫前日まで			
	炭疽病						
トマト	葉かび病						
	灰色かび病						
なす	うどんこ病						
	すすかび病						
葉たまねぎ	灰色腐敗病			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
	べと病						
たまねぎ	灰色腐敗病			収穫前日まで			
	べと病						
ねぎ	灰色かび病	2000倍		収穫3日前まで	4回以内		4回以内
	さび病						
	べと病						
	黄斑病						
	黒斑病						
葉枯病							
わけぎ	さび病			収穫7日前まで			
あさつき	べと病						
	黄斑病						
にら	白斑葉枯病			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで			

名称: アミスター20フロアブル
 種類: アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
にんにく	さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	葉枯病						
はくさい	べと病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	黒斑病						
	白さび病						
レタス	白斑病	2000倍	3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	土壌灌注	4回以内(土壌灌注は2回以内)
	菌核病						
	灰色かび病						
	べと病						
非結球レタス	すそ枯病	2000倍	3L/m ²	収穫30日前まで	2回以内	土壌灌注	4回以内(土壌灌注は2回以内)
	ビッグベイン病						
キャベツ	菌核病	2000倍	3L/m ²	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	株腐病						
いちご	炭疽病	1500～2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	苗床: 4回以内 本圃: 3回以内	散布	7回以内(苗床では4回以内、本圃では3回以内)
	うどんこ病	2000倍					
	灰色かび病	1500倍					
	うどんこ病	1500～2000倍					
	炭疽病	2000倍					
アスパラガス	灰色かび病	2000倍	3L/m ²	収穫3日前まで	4回以内	散布	4回以内
	茎枯病						
	斑点病						
ブロッコリー	褐斑病	2000倍	3L/m ²	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
てんさい	べと病	1500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	苗床灌注	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)
	葉腐病						
	褐斑病						
茶	根腐病	500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)	定植前	1回	苗床灌注	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)
	炭疽病	2000倍	100～400L/10a	摘採14日前まで	3回以内	散布	3回以内
輪斑病							
非結球あぶらな科葉菜類	新梢枯死症(輪斑病菌による)	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内(粒剤は1回以内)
エンダイブ	もち病						
らっきょう	白さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
パセリ	菌核病						
みつば	さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
みょうが(花穂)	うどんこ病						
みょうが(茎葉)	灰色かび病	2000倍	3L/m ²	収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	1回	土壌灌注	1回
みょうが(花穂)	紋枯病						
みょうが(茎葉)	紋枯病	2000倍	3L/m ²	収穫3日前まで	2回以内	土壌灌注	3回以内(粒剤は1回以内)
みょうが(花穂)	紋枯病						
しそ	斑点病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	株元散布	2回以内

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数			
せり	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(粒剤の散布は1回以内、水和剤の散布は4回以内)			
クレソン	斑点病			収穫21日前まで	3回以内		3回以内			
だいこん	白さび病			収穫14日前まで			3回以内	3回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は1回以内)		
	ワッカ症									
あずき	炭疽病		60～200L/10a	収穫7日前まで	1回		3回以内			
葉ごぼう	うどんこ病		100～300L/10a	収穫21日前まで			1回			
いんげんまめ	炭疽病		60～200L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内			
こおにたびらこ	菌核病		60～200L/10a	収穫30日前まで	1回		1回			
ははこぐさ										
ズッキーニ	うどんこ病		100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内		4回以内	4回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は2回以内)		
ピーマン	灰色かび病									
オクラ	うどんこ病									
畑わさび	白さび病							収穫7日前まで	2回以内	2回以内
わさび										
かぶ	白斑病							収穫7日前まで		
さやいんげん	灰色かび病	3回以内				3回以内		3回以内		
さやえんどう	菌核病									
	褐紋病									
実えんどう	灰色かび病	3回以内				3回以内		3回以内		
えだまめ	菌核病									
	セルリー	褐紋病	収穫前日まで	4回以内	4回以内					
未成熟そらまめ	べと病	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	3回以内					
ばれいしょ	さび病									
	夏疫病	3000～4000倍	収穫7日前まで							
	黒あざ病	500倍	—	植付前	1回以内	瞬時種いも浸漬 植溝内土壌散布	5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内)			
100～200倍		20L/10a	植付時							
やまのいも	葉洗病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
モロヘイヤ	炭疽病							4回以内		
	せんぶり			灰色かび病	収穫7日前まで				3回以内	
きく	さび病			発病初期	5回以内					
たばこ	白さび病	2000～3000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)				
	赤星病									