

名称: アミスターオプティフロアブル  
種類: アゾキシストロピン・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	べと病	1000倍	100～400L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)
	うどんこ病							
	褐斑病							
	炭疽病							
	灰色かび病							
	菌核病							
黒星病								
かぼちゃ	うどんこ病			収穫7日前まで	3回以内			
	べと病							
	疫病							
メロン	べと病			収穫3日前まで	4回以内			
	うどんこ病							
	つる枯病							
すいか	菌核病			収穫前日まで	2回以内			
	炭疽病							
	つる枯病							
	うどんこ病							
トマト	褐色腐敗病	収穫前日まで	2回以内					
	菌核病							
	疫病							
ミニトマト	葉かび病	収穫7日前まで	4回以内					
	炭疽病							
	灰色かび病							
	すすかび病							
	斑点病							
なす	炭疽病	収穫前日まで	4回以内					
	菌核病							
	黒枯病							
	灰色かび病							
	べと病							
はくさい	白斑病	収穫7日前まで	2回以内					
	黒斑病							
	白さび病							
にんじん	黒葉枯病	収穫21日前まで	2回以内					
	斑点病							
たまねぎ	菌核病	収穫7日前まで	4回以内					
	灰色かび病							
ねぎ	べと病	収穫14日前まで	3回以内					
	さび病							
	黒斑病							
	黄斑病							
	葉枯病							
小菌核腐敗病								
にんにく	さび病	収穫7日前まで	3回以内	6回以内				
だいこん	白さび病	収穫45日前まで	3回以内	3回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は1回以内)				
ピーマン	斑点病	収穫前日まで	4回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は2回以内)	3回以内				
	うどんこ病							
	黒枯病							
	炭疽病							
にがうり	炭疽病	収穫前日まで	3回以内	4回以内				
	灰色かび病							
にがうり	うどんこ病	収穫7日前まで	3回以内	4回以内				