

殺菌剤

 名称: フォリオプラボ顆粒水和剤
 種類: メタラキシル・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|-------|---------|----------|--------------|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100～400L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 10回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内) |
| | 炭疽病 | | | | | | | |
| | うどんこ病 | | | | | | | |
| | 褐斑病 | | | | | | | |
| メロン | つる枯病 | | | 収穫3日前まで | | | | |
| | べと病 | | | | | | | |
| | うどんこ病 | | | | | | | |
| すいか | つる枯病 | | | 収穫7日前まで | | | | |
| | 炭疽病 | | | | | | | |
| | 褐色腐敗病 | | | | | | | |
| トマト | 疫病 | 500～750倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 5回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) | 6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内) | | |
| ばれいしょ | 夏疫病 | | | | | | 750倍 | 3回以内 |
| たまねぎ | べと病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 6回以内 | | |
| 灰色かび病 | | | | | | | | |
| かぼちゃ | べと病 | | | 2回以内 | | 3回以内 | | |
| はくさい | 白さび病 | | | | | | | |
| | ピシウム腐敗病 | | | | | | | |
| | べと病 | | | | | | | |

殺菌剤

名称: フォリオブラボ顆粒水和剤
種類: メタラキシル・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数 | TPNを含む農薬の総使用回数 |
|-------|--------|-------|--------------|----------|---------|------|--------------------------------|-----------------------------|
| らっきょう | 白色疫病 | 1000倍 | 100～400L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | べと病 | | | | | | 4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) | 4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| なす | 褐色腐敗病 | | | 収穫前日まで | | | 4回以内 | |