

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
 種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病	1500倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内(休眠期は1回以内)
ばれいしょ	疫病	500～1000倍	100～400L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	5回以内
ミニトマト		800～1000倍			2回以内		4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	2回以内
トマト		葉かび病			800倍		4回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)
きゅうり	うどんこ病			3回以内			4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)
	褐斑病							
メロン	べと病	800～1000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	5回以内
	うどんこ病	800倍						
	つる枯病							

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
すいか	つる枯病	800倍	100～400L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	5回以内
	炭疽病							
	褐色腐敗病	800～1000倍						
たまねぎ	灰色かび病	800倍		4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)				
ねぎ	べと病	800～1000倍			収穫14日前まで			2回以内
キャベツ	ピシウム腐敗病	1000倍		収穫7日前まで	3回以内			
はくさい	べと病	800～1000倍						
	白さび病	1000倍						
レタス	べと病	800倍		収穫14日前まで	3回以内			5回以内 (土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)

殺菌剤

名称: フォリオゴールド
種類: メタラキシルM・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
らっきょう	白色疫病	1000倍	100～400L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
ブロッコリー	べと病			出蕾前 但し、収穫21日前まで	2回以内		3回以内 (土壌灌注は1回以内、 散布は2回以内)	
アスパラガス	疫病			収穫7日前まで	3回以内		4回以内 (種子への処理は1回以内、 は種後は3回以内)	3回以内
かぼちゃ	疫病							
	べと病							
なす	褐色腐敗病	800～1000倍	収穫前日まで			4回以内		
	うどんこ病	800倍						
	すすかび病							