

## 殺菌剤

名称:レーバスフロアブル  
種類:マンジプロパミド水和剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	375～500倍	25L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
		1500～2000倍					
だいず	べと病	1500～3000倍	60～200L/10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
あずき		1500～2000倍					
ぶどう	べと病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内		2回以内
はくさい		2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内		
ブロッコリー					3回以内		
レタス							2回以内
非結球レタス				3回以内			
キャベツ					2回以内		
ねぎ				3回以内			
ほうれんそう					2回以内		
たまねぎ				白色疫病		2回以内	
すいか				褐色腐敗病	収穫前日まで		
ミニトマト	疫病	1500～2000倍			3回以内	3回以内	
トマト							

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

## シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号