

殺菌剤

名称:リドミルゴールドMZ
種類:マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	500~1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	10回以内(無人ヘリ散布は3回以内)	3回以内
トマト		1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)
キャベツ	べと病		収穫30日前まで	3回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)			
ねぎ			収穫前日まで					
きゅうり			収穫7日前まで					
メロン			2回以内					
小粒種ぶどう(露地栽培)	べと病		200~700L/10a	収穫60日前まで	2回以内		2回以内	
大粒種ぶどう(露地栽培)		2回以内(但し、開花後1回)		2回以内(開花後は1回以内)				
ぶどう(施設栽培)		開花前まで		2回以内	2回以内			
みかん	褐色腐敗病	1000倍	200~700L/10a	収穫30日前まで	1回		4回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
はくさい	べと病				2回以内			
	ピシウム腐敗病							
かぼちゃ	疫病				5回以内			
たまねぎ	べと病							
あずき	茎疫病	500倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)	
だいず	べと病			収穫30日前まで			4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)	
すいか	褐色腐敗病			収穫45日前まで				
わさびだいこん	白さび病			収穫7日前まで			7回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
いちご	疫病	1000倍	200~400L/10a	収穫14日前まで	3回以内	6回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内)	
			50mL/株(200~400L/10a)	育苗期				