

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキソニル水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数					
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍	100~ 300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内					
さやいんげん												
さやえんどう												
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	1000倍	収穫前日まで										
えだまめ	赤かび病			4回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)								
きゅうり	灰色かび病			1000~1500倍				3回以内				
	菌核病											
	褐斑病			1000倍								
トマト	灰色かび病			1000~1500倍				-	定植直前	1回	5分間セル苗浸漬 5分間苗根部浸漬	4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内)
なす												
いちご			炭疽病		1000倍							
	たまねぎ		灰色かび病	1000~1500倍								
小菌核病			1500倍									
灰色腐敗病		500倍										
黒腐菌核病		500~1000倍										
キャベツ	菌核病	1000倍	100~ 300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(種子への処理は1回以内、散布は3回以内)					
	株腐病											
にら	白斑葉枯病	2000倍		収穫7日前まで								
らっきょう	灰色かび病	1000倍		収穫前日まで				3回以内	3回以内			
ふき				収穫7日前まで				2回以内	2回以内			
花き類・観葉植物				発病前~発病初期				4回以内	4回以内			