

## 殺菌剤

名称:スコア顆粒水和剤  
種類:ジフェノコナゾール水和剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数									
りんご	黒星病	3000~4000倍	200~700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内									
	斑点落葉病	3000倍														
	うどんこ病															
	赤星病	3000~4000倍														
	黒点病	3000倍														
	モニリア病	2000~3000倍														
なし	黒星病	4000倍		200~700L/10a				収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
	赤星病															
	輪紋病	2000倍														
	黒斑病															
かき	うどんこ病	3000倍						200~700L/10a				収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	炭疽病															
	落葉病															
おうとう	灰星病	2000倍	200~700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内									
もも												黒星病				
ネクタリン	灰星病															
	黒星病															
すもも	灰星病			2000倍				200~700L/10a				収穫前日まで				2回以内
あんず																
うめ	黒星病	3000倍	200~700L/10a		収穫7日前まで	3回以内	散布		3回以内							
	すす斑症															
マルメロ	ごま色斑点病	2000倍			200~400L/10a					収穫前日まで	3回以内	散布				
メロン	つる枯病															
	うどんこ病															
すいか	つる枯病															
	うどんこ病															
	炭疽病															
トマト	葉かび病		2000倍	200~400L/10a		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内							
	すすかび病															
きゅうり	うどんこ病															
	黒星病															
かぼちゃ	うどんこ病					2000倍				200~400L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
いちご											収穫前日まで					
茶	炭疽病	2000倍			200~400L/10a		摘採14日前まで	2回以内	散布		2回以内					
	もち病															
	網もち病															
	褐色円星病															

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号

シンジェンタ ジャパン株式会社  
www.syngenta.co.jp