

## 殺菌剤

名称: ユニフォーム粒剤  
 種類: アゾキシストロピン・メタラキシルM粒剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
みょうが(茎葉)	根茎腐敗病	18kg/10a	みょうが(花穂)の収穫30日前まで、但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで	1回	土壌表面散布	3回以内(粒剤は1回以内)	2回以内
みょうが(花穂)			収穫30日前まで	3回以内	定植前作条土壌混和又は生育期土壌表面散布	3回以内	3回以内
しょうが							
ホップ	べと病	20g/株	株ごしらえ時～選芽期	1回	株元散布	1回	1回
ピーマン	疫病	3g/株	収穫前日まで			4回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は2回以内)	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
とうがらし類						1回	
こまつな	白さび病	9kg/10a	は種前但し、収穫21日前まで		全面土壌混和	2回以内(粒剤は1回以内)	2回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内)
タアサイ			定植時				
だいこん			は種時				
べにばないんげん	茎根腐病	1g/株	定植時		株元散布	1回	1回
たばこ	疫病	6kg/10a	大土寄期			3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)	

## 殺菌剤

名称: ユニフォーム粒剤  
種類: アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤

### 適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
せり	葉腐病	3kg/10a	収穫21日前まで	1回	湛水散布	5回以内(粒剤の散布は1回以内、水和剤の散布は4回以内)	2回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は1回以内)
くわい	茎腐病			2回以内			
しちとうい	べっこう病		生育期				