

殺虫殺菌剤

名称: クルーザーMAXX
種類: チアマトキサム・フルジオキシニル・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアマトキサムを含む農薬の総使用回数	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類	原液	乾燥種子1kg 当り8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	1回	4回以内 (種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
	タネバエ								
	ネキリムシ類								
	フタスジヒメハムシ								
	茎疫病								
	リゾクトニア根腐病								
	苗立枯病(ピシウム菌)								
	紫斑病								
あずき	アブラムシ類						1回		
えだまめ	アブラムシ類	原液	乾燥種子1kg 当り8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	4回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)	1回
	タネバエ								
	ネキリムシ類								
	フタスジヒメハムシ								
	茎疫病								
	リゾクトニア根腐病								
てんさい	苗立枯病(リゾクトニア菌)	原液	乾燥種子1ユニット(約10万粒)当り6mL	は種前	1回	塗沫処理	2回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後から定植前は1回以内)	1回	1回
	苗立枯病(ピシウム菌)								
	テンサイトビハムシ								

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジエンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号