

除草剤

名称:コダール水和剤
種類:プロメトリン・メトラクロール水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プロメトリンを含む農薬の総使用回数	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量						
とうもろこし	一年生雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)	砂壤土～埴土	300～ 400g/10a	70～100L/10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回	1回	
飼料用とうもろこし								全域			
えだまめ											
だいず											
さやいんげん											
いんげんまめ											
べにばないんげん											
らっかせい											関東以西
にんじん								全域			
たまねぎ	定植活着15日後まで(雑草発生前)又は 中耕除草後、但し、収穫90日前まで(雑草発生前)	200～ 300g/10a	70～100L/10a	1回	北海道						
やまのいも	植付後萌芽前 (雑草発生前)	300～ 400g/10a	100L/10a		畦間土壌散布	全域					
	萌芽後(イネ科雑草2葉期まで)										
桑	春期萌芽前及び夏切り後(雑草発生前)			2回以内	全面土壌散布	2回以内	2回以内				

・使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号