

除草剤

名称: デュアル乳剤
種類: メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量						
とうもろこし 飼料用とうもろこし	一年生イネ科雑草	本葉1~2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	砂壤土~埴土	200~ 400mL/10a	70~100L/10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回		
かんしょ	一年生雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)						北海道、東北			
えだまめ(直播栽培)		は種後発芽前 (雑草発生前)									
えだまめ(移植栽培)		定植前(雑草発生前)									
だいず		は種後発芽前 (雑草発生前)									
らっかせい											
いんげんまめ											
さいいんげん		定植後 但し、 収穫90日前まで(雑草発生前)									
てんさい(移植栽培)	一年生イネ科雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)						2回以内		全域	2回以内
てんさい(直播栽培)	一年生雑草	定植直後~定植15日後まで (雑草発生前)						200~ 300mL/10a		畦間株間土壌散布	1回
キャベツ		は種直後(雑草発生前)	100~ 200mL/10a	東北							
だいこん		植付後萌芽前 (雑草発生前)	300~ 400mL/10a	全域							
にんじん											
ばれいしよ		植付後又は培土後萌芽前 (雑草発生前)	200~ 400mL/10a	100~ 200mL/10a							
こんにやく		は種直後(雑草発生前)									
さといも		は種直後(雑草発生前)									
かぶ		一年生イネ科雑草	春期雑草発生前	600~ 700mL/10a	150~ 250L/10a	2回以内	全面土壌処理	全域	3回以内		

・ 使用上の注意事項などについては、弊社ホームページ(<http://www.syngenta.co.jp>)を参照して下さい。

シンジェンタ ジャパン株式会社

東京都中央区晴海1丁目8番10号