

除草剤

名称:デュアルゴールド
種類:S-メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農業の総使用回数			
			薬量	希釈水量							
とうもろこし 飼料用とうもろこし	一年生イネ科雑草	本葉1~2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	70~ 100mL/10a	70~100L/10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回			
	かんしょ	一年生雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)				70~ 130mL/10a				
挿苗後 但し、収穫90日 前まで(雑草発 生前)											
マルチ前・挿苗 前 (雑草発生前)											
えだまめ だいず らっかせい	一年生雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a				2回以内		全面土壌散布	北海道 東北	2回以内
いんげんまめ さやいんげん		は種後出芽前 期 (雑草発生前)									
てんさい (直播栽培)	一年生イネ科 雑草	は種後出芽前 期 (雑草発生前)	70~ 100mL/10a				1回		畦間株間土壌 散布	全域	1回
てんさい (移植栽培)	一年生雑草	定植後 但し、収穫90日 前まで(雑草発 生前)									
キャベツ		定植直後~定 植15日後まで (雑草発生前)									
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	100~ 130mL/10a				全面土壌散布		全域		
さといも		70~ 130mL/10a									
こんにゃく		植付後又は培 土後萌芽前 (雑草発生前)	100~ 130mL/10a								