

除草剤

名称:プリグロックスL
種類:ジクワット・パラコート液剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートをを含む農薬の総使用回数			
				薬量	希釈水量							
移植水稻	圃場内の周縁部	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000mL/10a	100~150L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	2回以内			
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000mL/10a								
麦類			は種前又はは種後出芽前雑草生育期			4回以内		4回以内	4回以内			
さとうきび		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで	1000~2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内			
未成熟とうもろこし		一年生雑草	畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1000mL/10a		5回以内		2回以内	2回以内	2回以内	2回以内	
とうもろこし(子実)			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下)									
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)			は種前又は植付前					2回以内	2回以内	2回以内		
だいず			畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで					4回以内	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内
			は種前又は植付前									
			は種後出芽前雑草生育期(草丈20cm以下)									
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにゃく、みずいもを除く)			植付前			3回以内	3回以内	3回以内				
えだまめ			畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫14日前まで			4回以内	4回以内	4回以内	4回以内			
ばれいしょ			萌芽直前		400~600mL/10a 200~300mL/10a(北海道)	2回以内	2回以内	2回以内(茎葉枯凋は1回以内)	2回以内			
			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで		400~600mL/10a							

除草剤

名称: プリグロックスL
種類: ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含まない農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
かんしょ やまのいも	-	一年生雑草	植付前	600～ 1000mL/10a	100～150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内	
さといも			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで							
			植付前							
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで							
こんにやく		植付前								
		植付後から萌芽直前								
果樹類(かんきつを除く)		多年生雑草	は種前又は植付前	800～ 1000mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内	5回以内
		スギナ	雑草生育期 但し、収穫前日まで	1500～ 2000mL/10a						
			一年生雑草	1000～ 2000mL/10a						
かんきつ		多年生雑草	は種前又は植付前	800～ 1000mL/10a						
		スギナ ツユクサ	雑草生育期 但し、収穫前日まで	1500～ 2000mL/10a						
			一年生雑草	1000～ 2000mL/10a						
いちご	一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)	一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
キャベツ カリフラワー だいこん ごぼう	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	600～ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ	一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫14日前まで	600～ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				

除草剤

名称:プリグロックスL
種類:ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートをを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく		一年生雑草	は種前又は植付前	600～ 1000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで						
アスパラガス		スギナ	は種前又は植付前	1000～ 2000mL/11a					
			萌芽前: 雑草生育期(草丈20cm以下) 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
ふき	-	一年生雑草	萌芽前	600～ 1000mL/11a	100～150L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
みょうが(花穂)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫21日前まで						
みょうが(茎葉)			萌芽前 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
うど			萌芽前 畦間処理: 雑草生育期 但し、みょうが(花穂)の収穫30日前まで、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで						
パセリ やまのいも(むかご)			畦間処理: 雑草生育期(根株養成期)						
たけのこ			は種前又は植付前 畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫7日前まで						
茶 桑	一年生及び多年生雑草	萌芽前: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで	1000～ 2000mL/10a		3回以内	3回以内	3回以内	3回以内	
たばこ			摘採7日前まで 春期萌芽前又は伐採後	800～ 1000mL/10a		1回	1回	1回	1回
チューリップ		一年生雑草	植付後萌芽前(雑草生育期)	600～ 1000mL/10a		3回以内		3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)
花き類・観葉植物(チューリップを除く)	畦間処理: 雑草生育期(草丈20cm以下)	3回以内	3回以内						
樹木類			雑草生育期(草丈30cm以下)						

除草剤

名称:プリグロックスL
種類:ジクワット・パラコート液剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
水田作物 畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期	800~1000mL/10a	100~150L/10a	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内	4回以内
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔			多年生雑草		雑草生育期		600~1000mL/10a	5回以内
		樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等				一年生雑草	雑草生育期	1000~2000mL/10a
スギナ	スギナ生育期			1500~2000mL/10a					
							800~1000mL/10a		
				1000~2000mL/10a					

適用の範囲と使用方法

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1mL/株	第2葉展開期から開花20日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)