

芝生用殺菌剤

農林水産省登録
第22062号



サブデューマックス®

液剤

®はシンジェンタ社の登録商標です。

実績が物語る安心と信頼

ピシウム対策の中心は 常にメタラキシルM



サブデューマックス®

液剤

syngenta®

黄化萎縮病に適用拡大

TM

特長

- ◎抗菌性及び浸透性に優れ、ピシウム属菌に対して高い予防効果と治療効果を発揮します。
- ◎非常に粒子の細かいマックス製剤のため、すばやく植物内に吸収され、降雨や散水の影響を受けにくく、安定した効果が期待できます。
- ◎ベントグラスへの安全性が高く、グリーンにも安心してご使用いただけます。

適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス)	赤焼病	1000倍	500mL / m ²	発病初期	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
	ピシウム病	400倍	200mL / m ²				
		200倍	100mL / m ²				
日本芝 (こらいしば)	黄化萎縮病	1000倍	500mL / m ²				

効果・薬害等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具および散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液は調製した日に使い切ってください。
- あぶらな科、うり科、まめ科の作物には薬害を生ずるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合はかからないように注意してください。
- 本剤の連続使用により薬剤耐性菌が出現するおそれがあるので、連用をさけ作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄してください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ※水産動植物に関する注意事項:この登録に係る使用方法では該当がありません。
 ※危険物第4類第3石油類に属するので火気には十分注意してください。
 ※貯蔵上の注意事項:火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空き瓶は圃場などに放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

販売
シンジェンタ ジャパン株式会社
 ローン アンド ガーデン事業本部
 〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
 TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899
<http://www.syngenta.co.jp/golf>

取扱い