



農林水産省登録
第21983号

芝生用殺虫剤

ヨトウ・タニ[®]

乳剤

ヨトウ・カイガラムシに効くぞー!

syngenta[®]

® はシンジェンタ社の登録商標

芝生用殺虫剤

ヨトウタン[®] 乳剤

- 包装単位：500ml × 20
- 成分：ピリミホスメチル……………49.0%
有機溶剤等……………51.0%
- 人畜毒性：普通物
- 危険物：第4類第2石油類

ピリミホスメチル乳剤

特長

- 安全性が高い速効性の鱗翅目殺虫剤です。
- チガヤシロオカイガラムシに高い効果を示します。



適用内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリミホスメチルを含む農薬の総使用回数
芝	スジキリヨトウ シバツトガ チガヤシロオカイガラムシ	1000倍	0.3L/m ²	発生初期	5回以内	散布	5回以内

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 大型散布機で使用する場合は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
- 薬剤散布に関しては、芝表面、地際にまきむらのないように散布してください。
- たばこには薬害を生ずるおそれがあるので付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

(水産動植物に関する注意：水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう十分注意して使用して下さい。)

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階

(TEL) 03-6221-3802 (FAX) 03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp

取扱い